

Methotrexat – Übersicht der Fertigspritzen-Präparate nach Stärke (in mg) mit Angabe von Konzentration (in mg/ml) und Packungsgröße (in ml).

<b>2,5 mg</b>	<b>STADA</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Pfizer</b>	<b>Mylan dura</b>	<b>Mibe</b>	<b>Medac</b>	<b>Medac</b>	<b>Hexal</b>	<b>1A Pharma</b>
Präparat		MTX Sandoz							MTX HEXAL	
Konzentration		7,5 mg/ml							7,5 mg/ml	
Packungsgröße		0,33 ml							0,33 ml	
<b>7,5 mg</b>	<b>STADA</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Pfizer</b>	<b>Mylan dura</b>	<b>Mibe</b>	<b>Medac</b>	<b>Medac</b>	<b>Hexal</b>	<b>1A Pharma</b>
Präparat	Methotrexat STADA	MTX Sandoz		Lantarel FS	MTX dura	Methotrexamed	METEX FS	MTX Medac FS	MTX HEXAL	METHOTREXAT 1A
Konzentration	25 mg/ml	7,5 mg/ml		25 mg/ml	7,5 mg/ml	25 mg/ml	50 mg/ml	10 mg/ml	20 mg/ml	7,5 mg/ml
Packungsgröße	0,30 ml	1 ml		0,30 ml	1 ml	0,30 ml	0,15 ml	0,75 ml	0,38 ml	1 ml
<b>10 mg</b>	<b>STADA</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Pfizer</b>	<b>Mylan dura</b>	<b>Mibe</b>	<b>Medac</b>	<b>Medac</b>	<b>Hexal</b>	<b>1A Pharma</b>
Präparat	Methotrexat STADA	MTX Sandoz		Lantarel FS	MTX dura	Methotrexamed	METEX FS	MTX Medac FS	MTX HEXAL	METHOTREXAT 1A
Konzentration	25 mg/ml	7,5 mg/ml		25 mg/ml	7,5 mg/ml	25 mg/ml	50 mg/ml	10 mg/ml	20 mg/ml	7,5 mg/ml
Packungsgröße	0,40 ml	1,33 ml		0,40 ml	1,33 ml	0,40 ml	0,20 ml	1 ml	0,50 ml	1,33 ml
<b>12,5 mg</b>	<b>STADA</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Pfizer</b>	<b>Mylan dura</b>	<b>Mibe</b>	<b>Medac</b>	<b>Medac</b>	<b>Hexal</b>	<b>1A Pharma</b>
Präparat							METEX FS			
Konzentration							50 mg/ml			
Packungsgröße							0,25 ml			
<b>15 mg</b>	<b>STADA</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Sandoz</b>	<b>Pfizer</b>	<b>Mylan dura</b>	<b>Mibe</b>	<b>Medac</b>	<b>Medac</b>	<b>Hexal</b>	<b>1A Pharma</b>
Präparat	Methotrexat STADA	MTX Sandoz		Lantarel FS	MTX dura	Methotrexamed	METEX FS	MTX Medac FS	MTX HEXAL	METHOTREXAT 1A
Konzentration	25 mg/ml	7,5 mg/ml		25 mg/ml	7,5 mg/ml	25 mg/ml	50 mg/ml	10 mg/ml	20 mg/ml	7,5 mg/ml
Packungsgröße	0,60 ml	2 ml		0,60 ml	2 ml	0,60 ml	0,30 ml	1,50 ml	0,75 ml	2 ml

Methotrexat – Übersicht der Fertigspritzen-Präparate nach Stärke (in mg) mit Angabe von Konzentration (in mg/ml) und Packungsgröße (in ml).

17,5 mg	STADA	Sandoz	Sandoz	Pfizer	Mylan dura	Mibe	Medac	Medac	Hexal	1A Pharma
Präparat							METEX FS			
Konzentration							50 mg/ml			
Packungsgröße							0,35 ml			
20 mg	STADA	Sandoz	Sandoz	Pfizer	Mylan dura	Mibe	Medac	Medac	Hexal	1A Pharma
Präparat	Methotrexat STADA	MTX Sandoz	MTX Sandoz	Lantarel FS	MTX dura	Methotrexamed	METEX FS	MTX Medac FS	MTX HEXAL	METHOTREXAT 1A
Konzentration	25 mg/ml	7,5 mg/ml	20 mg/ml	25 mg/ml	7,5 mg/ml	25 mg/ml	50 mg/ml	10 mg/ml	20 mg/ml	7,5 mg/ml
Packungsgröße	0,80 ml	2,67 ml	1 ml	0,80 ml	2,67 ml	0,80 ml	0,40 ml	2 ml	1 ml	2,67 ml
22,5 mg	STADA	Sandoz	Sandoz	Pfizer	Mylan dura	Mibe	Medac	Medac	Hexal	1A Pharma
Präparat							METEX FS			
Konzentration							50 mg/ml			
Packungsgröße							0,45 ml			
25 mg	STADA	Sandoz	Sandoz	Pfizer	Mylan dura	Mibe	Medac	Medac	Hexal	1A Pharma
Präparat	Methotrexat STADA	MTX Sandoz	MTX Sandoz	Lantarel FS		Methotrexamed	METEX FS	MTX Medac FS	MTX HEXAL	METHOTREXAT 1A
Konzentration	25 mg/ml	7,5 mg/ml	20 mg/ml	25 mg/ml		25 mg/ml	50 mg/ml	10 mg/ml	20 mg/ml	7,5 mg/ml
Packungsgröße	1 ml	3,33 ml	1,25 ml	1 ml		1 ml	0,50 ml	2,50 ml	1,25 ml	3,33 ml
27,5 mg	STADA	Sandoz	Sandoz	Pfizer	Mylan dura	Mibe	Medac	Medac	Hexal	1A Pharma
Präparat							METEX FS			
Konzentration							50 mg/ml			
Packungsgröße							0,55 ml			
30 mg	STADA	Sandoz	Sandoz	Pfizer	Mylan dura	Mibe	Medac	Medac	Hexal	1A Pharma
Präparat			MTX Sandoz				METEX FS		MTX HEXAL	
Konzentration			20 mg/ml				50 mg/ml		20 mg/ml	
Packungsgröße			1,50 ml				0,60 ml		1,50 ml	

**Methotrexat STADA® 25 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze. Zus.:** 1 FS m. 0,3 ml enth.: 7,5 mg Methotrexat. 1 FS m. 0,4 ml enth.: 10 mg Methotrexat. 1 FS m. 0,6 ml enth.: 15 mg Methotrexat. 1 FS m. 0,8 ml enth.: 20 mg Methotrexat. 1 FS m. 1,0 ml enth.: 25 mg Methotrexat. **Sonst. Bestandt.:** Natriumchlorid, Natriumhydroxid-Lösung (10%), Wasser für Injektionszwecke. **Anw.:** akt. rheumat. Arthritis bei Erw., wenn Basisther. indiz. sind. Polyarthrit. Formen d. schw. akt. juv. idiopath. Arthritis b. mang. Ansprechen auf NSAR. Schw. Formen d. Psoriasis vulgaris, v.a. v. Plaque-Typ, d. korvent. nicht ausr. behandelbar sind, u. schw. Psoriasis arthropathica. **Gegenanz.:** Überempf. gg. d. Wirkst. od. e. d. sonst. Bestand. Leberinsuff., Alkoholmissbrauch, Niereninsuff., vorbesteh. Blutdyskrasien, schwere, akute oder chron. Infekt., gastroint. Geschwüre, Schwangersch., Stillzeit, gleichz. Impf. m. Lebendimpfstoffen. **Anw.-beschränk.:** Eingeschr. Lungenfkt., inakt. chron. Infekt., Zustände, die zu Dehydrat. führen, Durchfall u. ulzer. Stomatitis, gleichz. Einn. leber- u. nierenschädig. Subst., Folsäuremangel, höh. Alter, Kdr. u. Jugendl., pathol. Flüssigkeitsansamm. in Körperhöhlen, gleichz. UV-Bestrahl. Enthält Natriumverbindungen. **Warnhinw.:** Unbed. Dosierung beachten (nur 1-mal wöchentlich). **Hinw.:** Kontr.-untersuch. u. Sicherheitsmaßn. (vor u. währ. d. Ther.) Beachten. Kontakt v. Methotr. m. Haut/Schleimh. vermeiden. **Schwangersch. u. Stillz.:** Kontraind. **NW:** Lok. NW od. Schädig. (ster. Absz., Zerstör. d. Fettgew.) a. d. Injektionsstelle, Sepsis, oport. Infekt. Zytomeg.-Virus-Infekt., Lymphome, Leukozyto- u. Thrombozytopenie, Anämie, Pancytopenie, Agranulozyt., megaloblast. Anämie, Knochenmarkdepr., aplast. Anämie, Lymphadenopathie, hämatopoet. u. lymphoprolif. Stör., Eosinophilie, Neutropenie, Immunsuppr., Hypogammaglobulinämie, Schlaflosigk., Kopfschm., Erschöpfung, Benommenh., Schwindel, Verwirr., Depr., epilept. Anfälle, schwer beeinträcht. Sehverm., Stimmungsschwank., Schmerz, muskul. Asthenie od. Parästh. d. Extremit., Stör. d. Geschmacks, Meningismus (Lähm., Erbr.), akute asept. Meningitis, Stör. d. Sehverm., Konjunkt., Retinopathie, Perikard., Perikarderg., Perikardtamp., Hypotonie, thromboembol. Ereign. (einschl. arter. u. zerebr. Thrombose, Thrombophleb., tiefe Beinvenenthromb., retin. Venenthromb., Lungenemb.), Lungenkomplik., interst. Alveol./Pneumon., trock. Reizh., Kurzatmigg., Atemnot im Ruhezust., Brustschm., Fieber, Lungenfib., Pharyngitis, Atemlähm., Asth. bronch., Pneumocystis-carinii-Pneumonie, chron. obstr. Lungenerkr., Pleuraerguss, Infekt., Appetitlosigk., Übelk., Erbr., Bauchschm., Stomat., Dyspepsie, Durchf., Gastroint. Geschw. u. Blut. (sow. Mund- und Rachenschleimh.), Enteritis, Melaena, Gingiv., Malabs., Hämatem., tox. Megakolon, Erhöht. v. Leberenz. (ALAT, ASAT, Alkal. Phosph. u. Bilir.), Verfett. d. Leber, Fibrose, Zirrhose, diab. Stoffw., erniedr. Serumalb., ak. Hepatitis, Hepatotox., Reakt. e. chron. Hepatitis, ak. Leberdegen., Herpes simplex/zoster, Leberinsuff., Exanthem, Erythem, Juckreiz, Nesselausschl., Lichtempfindl., erh. Pigment. der Haut u. der Nägel, Haarverlust, verm. rheumat. Knoten, Plaque psoriasis, schw. tox. Reakt. (Vaskulitis, herpesart. Hautausschl., SJS, TEN/Lyell-Syndrom), Akne, Petechien, Ekchymose, Eryth. multiforme, akute Paronychie, Furunkulose, Telangiektasie, allerg. Vaskulitis, Hidradenitis, Nokardiose, Histoplasmose, Cryptococcus-Mykose, Arthralgie, Myalgie, Osteop., Ermüdungsfraktur, Entz. u. Geschw. d. Vag. u. d. Harnbl., Hämaturie, Dysurie, Nierenversagen, Oligurie, Anurie, Azotämie, Proteinurie, Libidoverl., Impot., Oligospermie, beeintr. Menstr., Scheidenausfl., Unfruchtbar., schw. allerg. Reakt., anaphyl. Schock, Fieber, beeintr. Wundheil. Beeintr. d. Reakt. sverm. mögl. !Angaben gekürzt - weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte d. Fach- bzw. Gebrauchsinformation. Verschreibungspflichtig. Stand: Januar 2012. **STADAPharm GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel**