





Bioäquivalenzstudie Candesartan/HCT STADA® 16 mg/12,5 mg Tabletten vs. Atacand® PLUS 16/12,5 mg Tabletten

Candesartan



	Candesartan/HCT STADA® 16 mg/12,5 mg	Atacand® PLUS 16/12,5 mg	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration (C _{max}) ng/ml:	113.24 ± 45.14	111.63 ± 40.55	94.05 – 108.82
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration (t _{max}) h:	4.21 ± 1.19	4.00 ± 1.01	
Fläche unter der Konzentrations- Zeit-Kurve (AUC _{0-t}) ng*h/ml:	1234.31 ± 407.20	1245.88 ± 339.95	92.57 – 104.00

Hydrochlorothiazid



	Candesartan/HCT STADA® 16 mg/12,5 mg	Atacand® PLUS 16/12,5 mg	90% Konfidenzintervall
maximale Plasmakonzentration (C _{max}) ng/ml:	85.88 ± 21.01	82.18 ± 21.67	99.82 – 110.86
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration (t _{max}) h:	1.96 ± 0.66	1.73 ± 0.61	
Fläche unter der Konzentrations- Zeit-Kurve (AUC _{0-t}) ng*h/ml:	510.63 ± 102.65	498.46 ± 107.12	99.50 – 106.17

**Candesartan/HCT STADA® 16 mg/12,5 mg Tabletten
ist bioäquivalent mit Atacand® PLUS 16/12,5 mg Tabletten.**

Quelle: Anapharm Inc., Canda (2007)