



Simeticon STADA®



280 mg Weichkapseln

MD Medizinprodukt

Dieses Medizinprodukt in Form einer 8,3 mm x 13,2 mm großen orangefarbenen Weichgelatine kapsel verbessert das Befinden im Darm- und Bauchbereich bei Personen, die unter Magen-Darm-Problemen aufgrund von Gasbildung leiden: Blähungen, aufgeblähter Bauch und Völlegefühl.

Indikationen:

Dieses Medizinprodukt ist für Erwachsene zur Vorbeugung oder Linderung von Magen-Darm-Beschwerden durch Gasbildung wie Blähungen und Völlegefühl bestimmt. Dieses Medizinprodukt ist für die Vorbereitung von Patienten vor einer diagnostischen Untersuchung im Bauchbereich (Endoskopie, Radiographie, Ultraschalluntersuchung) bestimmt.

Zweckbestimmung:

Das Medizinprodukt ist für Erwachsene zur Vorbeugung oder Linderung von Magen-Darm-Beschwerden durch Gasbildung wie Blähungen und Völlegefühl bestimmt. Es kann auch zur Vorbereitung vor einer diagnostischen Untersuchung im Bauchbereich (Endoskopie, Radiographie, Ultraschalluntersuchung) verwendet werden.

Zielgruppe:

Patienten mit Magen-Darm-Beschwerden aufgrund von Gasbildung: Blähungen, aufgeblähter Bauch und Völlegefühl. Patienten vor einer diagnostischen Untersuchung im Bauchbereich (Endoskopie, Radiographie, Ultraschalluntersuchung) auf ärztliche Empfehlung.

Vorgesehene Patientengruppe:

Dieses Medizinprodukt ist nur für Erwachsene vorgesehen.

Kontraindikationen / Gegenanzeigen:

- Bekannte Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen der Inhaltsstoffe

- Bekannte oder vermutete Perforation oder Obstruktion des Verdauungstraktes
- Kinder

Vorsichtsmaßnahmen:

Die gleichzeitige Verabreichung von Levothyroxin und Simeticon kann zu einer verminderten Wirksamkeit von Levothyroxin und damit zu einer verminderten Funktion der Schilddrüse führen.

Dieses Medizinprodukt kann von Diabetikern eingenommen werden, da es keinen Zucker enthält.

Da Simeticon über die Verdauung unverändert ausgeschieden wird, ist das Produkt auch für schwangere und stillende Frauen geeignet. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Produkt einnehmen. Die Sicherheit der Anwendung von Simeticon während der Schwangerschaft wurde nicht untersucht.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bisher liegen keine Berichte über Nebenwirkungen vor.

Warnhinweise:

Dieses Medizinprodukt darf nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung nach „EXP/Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Enthält Fischgelatine. Dieses Medizinprodukt darf nicht mehr verwendet werden, falls es Temperaturen außerhalb der angegebenen Lagerbedingungen ausgesetzt war oder falls die Verpackung beschädigt ist. Dann ist dieses in Übereinstimmung mit den lokalen Bestimmungen zu entsorgen.

Hinweise für die Einnahme / Gebrauchsanweisung:

Linderung bei Magen-Darm-Problemen: Täglich eine Weichkapsel nach jeder Hauptmahlzeit mit einem großen Glas Wasser einnehmen. Die Dosis von drei Weichkapseln innerhalb von 24 Stunden sollte nicht überschritten werden. Weichkapseln sind oral einzunehmen. Die maximale Behandlungsdauer beträgt 30 aufeinander folgende Tage.

Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen: Die Empfehlungen Ihres Arztes befolgen. Nur für Erwachsene. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur für den einmaligen Gebrauch.

Wirkungsweise:

Simeticon wirkt, indem es die Oberflächenspannung der im Magen-Darm-Trakt vorhandenen Luftblasen verringert und deren Zusammenlagerung bewirkt, was dazu beiträgt, dass

das Gas verteilt wird und die Gasspannung verringert wird. Simeticon wird vom Organismus weder aufgenommen noch verstoffwechselt, sondern wird ohne Veränderung mit dem Stuhl ausgeschieden. Die Weichkapsel löst sich schnell auf und wird danach vom Körper ausgeschieden. Sie fungiert nur als Trägerstoff für die Abgabe von Simeticon.

Bitte melden Sie eventuelle schwerwiegende Vorkommnisse / schwere Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von diesem Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde (www.bfarm.de).

Falls sich Ihre Symptome nicht bessern oder sogar schlimmer werden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Zutaten: Simeticon 280 mg, Weichkapselhülle: Fischgelatine 90,678 mg, Glycerin, gereinigtes Wasser, Eisenoxidgelb (E172, CI 77492), Eisenoxidrot (E172, CI 77491).

Lagerung: Bei 15 °C - 25 °C lagern.

Die Zusammenfassung der Sicherheit und der klinischen Wirksamkeit (Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)) finden Sie in EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) unter der Basis-UDI-DI: 8596024DEGASIN280MG2K.

Letzte Überarbeitung: 07/2026

Version-Nummer: 03



Walmart, a.s.
Polní 836
739 61 Trinec
Tschechische Republik
www.walmartgroup.stada



Vertrieb:
STADA Consumer Health Deutschland GmbH
Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel
www.stada.de

	Chargennummer		Verwendbar bis
	Nicht wiederverwenden		Hersteller
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Temperaturbegrenzung (15-25 °C)
	Conformité Européenne (Europäisches Konformitätskennzeichen)		Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs
	Produkt oder seine Verpackung nicht in der Umwelt entsorgen.		Achtung! Gebrauchsanweisung beachten
	Produktidentifizierungsnummer		Distributor/Vertrieb

CE 2265



9390623
2605 W 30137/L/01/DEU



Produkt/Product: SIMETICON 280MG SCA SD DE:PIL
STADA Mat.-Nr./Mat.-No.: 9390623 DZ: 2605
STADA Art.-Nr./Art.-No.: ---
Hersteller/Manufacturer: Walmart a.s.
Verpacker/Packager: ---
Hersteller Art.-Nr./Manufacturer Art.-No.: W 30137/L/01/DEU
Format/Size: 146 x 177 mm
Schriftgröße/Font-size: 7 pt - 22,4 pt
Pharma-Code: 6781
Flattermarke/Collating mark: ---
1. Farbe/Colour: ■ Black
2. Farbe/Colour: ---
3. Farbe/Colour: ---
4. Farbe/Colour: ---
5. Farbe/Colour: ---
6. Farbe/Colour: ---
7. Farbe/Colour: ---
8. Farbe/Colour: ---
9. Farbe/Colour: ---
10. Farbe/Colour: ---
Version: RZ 5. Loop Datum/Date: 09.07.2026
Agentur/Agency: STADA Agency
Grafik erstellt von/Graphic made by: AW
Genehmigt/Approved