
Patientenkarte für Topiramate



Für Frauen und Mädchen,
die schwanger werden können –
Empfängnisverhütung und Schwangerschaft

► **Was Sie wissen müssen**

- Dieses Arzneimittel enthält Topiramate und wird zur Behandlung von Epilepsie oder zur Vorbeugung von Migränekopfschmerzen eingesetzt.
- Topiramate kann ein ungeborenes Kind schwerwiegend schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

► **Was Sie tun müssen**

- Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientinnenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.
- Sie müssen während der Behandlung mit Topiramate und mindestens 4 Wochen nach der letzten Einnahme hochwirksame Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt wird Sie über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.

- Suchen Sie Ihren Arzt mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.
- Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.
- Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramate nur auf Anweisung Ihres Arztes ab, da sich Ihr Zustand sonst verschlechtern kann.

- Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Patientinnenleitfaden oder scannen Sie diesen QR Code, um ihn zu erhalten.



<https://www.stada.de/produkte/topiramate-stada>

▶ **Bewahren Sie diese Karte auf.**