Hukyndra®80 mg

Injektionslösung im Fertigpen Adalimumab

V Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können

dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4. Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält

wichtige Informationen. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Ihr Arzt wird Ihnen auch einen Patientenpass aushändigen, der wichtige Informationen zur Sicherheit enthält, die Sie vor und während der Behandlung mit Hukvndra® beachten sollten. Führen Sie diesen Patientenpass während der Behandlung und vier Monate, nachdem Sie die letzte Hukyndra®-Injektion erhalten haben, mit sich. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt

oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4. Was in dieser Packungsbeilage steht

Was ist Hukyndra® und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Anwendung von Hukyndra® beachten?

Wie ist Hukyndra® anzuwenden? Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie ist Hukyndra® aufzubewahren?

Inhalt der Packung und weitere Informationen Anweisung für die Anwendung

1. Was ist Hukyndra® und wofür wird es angewendet?

Hukyndra® enthält den Wirkstoff Adalimumab.

Hukyndra® wird angewendet, um folgende Erkrankungen zu behandeln:

- Rheumatoide Arthritis
- Plaque-Psoriasis • Hidradenitis suppurativa (Acne inversa)
- Morbus Crohn

 Colitis ulcerosa · Nicht infektiöse Uveitis.

Der Wirkstoff von Hukyndra®, Adalimumab, ist ein humaner monoklonaler Antikörper. Monoklonale Antikörper sind Eiweiße, die sich an ein bestimmtes Ziel anheften.

Das Ziel von Adalimumab ist das Eiweiß Tumornekrosefaktor-alpha (TNFa). TNFa ist beteiligt an Abwehrreaktionen des Körpers. Bei den oben genannten Erkrankungen ist die Menge an TNFa erhöht. Hukyndra® heftet sich an TNFa und verringert dadurch die entzündlichen Vorgänge bei diesen Erkrankungen.

Rheumatoide Arthritis

Die rheumatoide Arthritis ist eine entzündliche Erkrankung der Gelenke.

Hukyndra® wird angewendet, um eine mäßige bis schwere rheumatoide Arthritis bei Erwachsenen zu behandeln. Möglicherweise bekommen Sie zunächst andere Arzneimittel (Basistherapeutika wie Methotrexat). Wenn Sie nicht ausreichend auf diese Arzneimittel ansprechen, erhalten Sie Hukyndra®.

Hukyndra® kann auch zur Behandlung einer schweren aktiven und fortschreitenden (progressiven) rheumatoiden Arthritis ohne vorherige Methotrexat-Behandlung eingesetzt werden.

Hukyndra® kann das Fortschreiten der Gelenkschäden, die durch die entzündliche Erkrankung verursacht werden, verlangsamen und kann helfen, dass man die Gelenke wieder besser bewegen kann.

Ihr Arzt wird entscheiden, ob Sie Hukyndra® mit Methotrexat zusammen anwenden sollen oder alleine.

Plaque-Psoriasis

Plaque-Psoriasis (Schuppenflechte mit klar abgegrenzten Hautstellen) ist ein Hautzustand, der rote, schuppige, verkrustete Stellen auf der Haut verursacht, die mit silbrigen Schuppen bedeckt sind.

Plaque-Psoriasis kann auch die Nägel befallen, sodass diese spröde werden, sich verdicken und sich vom Nagelbett abheben, was schmerzhaft sein kann.

Hukyndra® wird angewendet, um die mittelschwere bis schwere chronische Plaque-Psoriasis bei Erwachsenen zu behandeln.

Hidradenitis suppurativa (Acne inversa)

Hidradenitis suppurativa ist eine chronische und oft schmerzhafte entzündliche Hauterkrankung. Zu den Beschwerden gehören unter anderem druckempfindliche Knötchen und Eiteransammlungen (Abszesse), aus denen Eiter austreten kann. Am häufigsten sind bestimmte Bereiche der Haut betroffen, wie z.B. unter den Brüsten, unter den Achseln, an den Innenseiten der Oberschenkel, in der Leistengegend und am Gesäß. An den betroffenen Stellen kann es auch zu Vernarbungen kommen.

Hukyndra® wird angewendet zur Behandlung von • mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa bei Erwachsenen und

• mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren.

Hukyndra® kann die Anzahl der Knötchen und Eiteransammlungen, die durch die Erkrankung verursacht werden, verringern und kann die Schmerzen, die oft mit dieser Erkrankung einhergehen, lindern. Möglicherweise bekommen Sie zunächst andere Arzneimittel. Wenn Sie nicht ausreichend auf diese Arzneimittel ansprechen, erhalten Sie Hukyndra®.

Morbus Crohn Morbus Crohn ist eine entzündliche Erkrankung des Verdauungstraktes.

Hukyndra® wird angewendet zur Behandlung von

• mittelschwerem bis schwerem Morbus Crohn bei Erwachsenen und • mittelschwerem bis schwerem Morbus Crohn bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren.

Möglicherweise bekommen Sie zunächst andere Arzneimittel. Wenn Sie nicht ausreichend auf diese Arzneimittel ansprechen, erhalten Sie Hukyndra®.

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa ist eine entzündliche Erkrankung des Dickdarms. Hukyndra® wird angewendet zur Behandlung von

• mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa bei Erwachsenen und • mittelschwerer bis schwerer Colitis ulcerosa bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren.

Möglicherweise bekommen Sie zunächst andere Arzneimittel. Wenn Sie nicht ausreichend auf diese Arzneimittel ansprechen, erhalten Sie Hukyndra®. Nicht infektiöse Uveitis

Die nicht infektiöse Uveitis ist eine entzündliche Erkrankung, die bestimmte Teile des Auges betrifft.

Hukyndra® wird angewendet zur Behandlung von • Erwachsenen mit nicht infektiöser Uveitis mit einer Entzündung im hinteren Bereich des Auges

• Kindern mit chronischer nicht infektiöser Uveitis ab 2 Jahren mit einer Entzündung im vorderen Bereich des Auges. Diese Entzündung kann dazu führen, dass man schlechter sieht und/oder dass

man Schwebeteile sieht (schwarze Punkte oder Schlieren, die sich durch das Blickfeld bewegen). Hukyndra® wirkt, indem es die Entzündung verringert. Möglicherweise bekommen Sie zunächst andere Arzneimittel. Wenn Sie nicht ausreichend auf diese Arzneimittel ansprechen, erhalten Sie Hukyndra®.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Hukyndra® beachten?

Hukyndra® darf nicht angewendet werden • Wenn Sie allergisch gegen Adalimumab oder einen der in Abschnitt 6.

genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind. Wenn Sie an einer aktiven Tuberkulose oder einer anderen schweren Infektion erkrankt sind (siehe "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen"). Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn bei Ihnen Anzeichen von Infektionen, z.B. Fieber, Wunden, Abgeschlagenheit, Zahnprobleme, vorliegen.

 Wenn Sie an mäßiger bis schwerer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) erkrankt sind. Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Arzt über zurückliegende oder bestehende ernsthafte Herzbeschwerden berichten (siehe "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen").

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Hukyndra® anwenden. Allergische Reaktionen

• Sollten Sie allergische Reaktionen bekommen mit Anzeichen wie Engegefühl in der Brust, pfeifende Atemgeräusche, Benommenheit/Schwindel, Schwellungen oder Hautausschlag, spritzen Sie sich kein weiteres Hukyndra® mehr und setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Arzt in Verbindung, da diese Reaktionen in seltenen Fällen lebensbedrohlich sein können.

<u>Infektionen</u>

· Wenn Sie eine Infektion haben, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Hukyndra®- Behandlung beginnen. Auch dann, wenn Sie die Infektion schon länger haben, oder die Infektion örtlich begrenzt ist (z. B. ein Unterschenkelgeschwür). Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt.

• Während der Behandlung mit Hukyndra® können Sie leichter an Infektionen erkranken. Das Risiko kann sich zusätzlich erhöhen, wenn Sie Probleme mit Ihrer Lunge haben. Diese Infektionen können schwer sein und umfassen:

o Tuberkulose o Infektionen, die durch Viren, Pilze, Parasiten oder Bakterien verursacht werden o Blutvergiftung

Diese Infektionen können in seltenen Fällen lebensbedrohlich sein. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn bei Ihnen Anzeichen wie Fieber, Wunden, Gefühl der Müdigkeit oder Zahnprobleme auftreten. Ihr Arzt wird Ihnen dann möglicherweise sagen, dass Sie die Anwendung von Hukyndra® für eine bestimmte Zeit unterbrechen sollen.

• Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie sich in Regionen aufhalten oder in Regionen reisen, in denen Pilzerkrankungen sehr häufig vorkommen (z. B. Histoplasmose, Kokzidioidomykose oder Blastomykose).

• Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie in der Vergangenheit Infektionen gehabt haben, die immer wieder aufgetreten sind, oder wenn Sie andere Krankheiten gehabt haben, die das Risiko einer Infektion erhöhen.

• Wenn Sie über 65 Jahre alt sind, können Sie für Infektionen anfälliger sein, während Sie Hukyndra® nehmen. Sie und Ihr Arzt sollten daher besonders auf Anzeichen einer Infektion achten, während Sie mit Hukyndra® behandelt werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn Sie Anzeichen von Infektionen bemerken wie Fieber, Wunden, Gefühl der Müdigkeit oder Zahnprobleme.

<u>Tuberkulose</u>

• Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren Arzt informieren, wenn Sie jemals Tuberkulose hatten oder in engem Kontakt mit jemandem waren, der Tuberkulose hatte. Wenn Sie eine aktive Tuberkulose haben, dürfen Sie Hukyndra® nicht anwenden. o Ihr Arzt wird Sie vor Beginn der Behandlung mit Hukyndra®

auf Anzeichen und Krankheitserscheinungen einer Tuberkulose untersuchen, da bei mit Adalimumab behandelten Patienten von Tuberkulosefällen berichtet wurde. Zu dieser gründlichen Untersuchung gehören die Aufnahme einer umfassenden medizinischen Vorgeschichte und geeignete Tests (z. B. eine Röntgen-Aufnahme des Brustkorbs und ein Tuberkulintest). Die Durchführung und Ergebnisse dieser Tests sollten in Ihrem **Patientenpass** dokumentiert werden. o Tuberkulose kann sich während der Behandlung entwickeln, sogar dann, wenn Sie eine Behandlung zur Vorbeugung gegen Tuberkulose bekommen haben.

o Benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn bei Ihnen Anzeichen einer Tuberkulose oder einer anderen Infektion während oder nach der Behandlung auftreten. Anzeichen einer Tuberkulose können z. B. sein: anhaltender Husten, Gewichtsverlust, das Gefühl keine Energie zu haben, leichtes Fieber.

Hepatitis B

• Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Träger des Hepatitis-B-Virus (HBV) sind, wenn Sie eine aktive HBV-Infektion haben oder wenn Sie glauben, dass Sie ein erhöhtes Risiko für eine HBV-Infektion haben.

o Ihr Arzt sollte Sie auf HBV untersuchen. Bei Personen, die dieses Virus tragen, kann Adalimumab dazu führen, dass eine HBV-Infektion wieder ausbricht. o In einigen seltenen Fällen, besonders bei der zusätzlichen Anwendung

von weiteren Arzneimitteln, die das körpereigene Abwehrsystem unterdrücken, kann der erneute Ausbruch einer HBV-Infektion lebensbedrohend sein.

Operationen oder Zahnbehandlungen

• Informieren Sie bitte Ihren Arzt vor einer Operation oder einer Zahnbehandlung über Ihre Behandlung mit Hukyndra®. Ihr Arzt kann eine kurzzeitige Unterbrechung der Hukyndra®-Behandlung empfehlen.

<u>Demyelinisierende Erkrankungen</u>

• Wenn Sie gerade eine Erkrankung entwickeln oder bereits haben, die die Schicht um die Nervenzellen beeinflusst (wie z. B. multiple Sklerose), wird Ihr Arzt entscheiden, ob Sie Hukyndra® anwenden bzw. weiter anwenden sollten. Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie schlechter sehen, wenn sich Ihre Arme oder Beine kraftlos

anfühlen oder wenn sich Körperteile taub oder kribbelig anfühlen.

<u>Impfungen</u>

Thermo code

• Gewisse Impfstoffe können Infektionen verursachen und sollten während der Behandlung mit Hukyndra® nicht verwendet werden.

o Besprechen Sie jede Impfung vorher mit Ihrem Arzt. o Bei Kindern und Jugendlichen wird empfohlen, nach Möglichkeit vor Behandlungsbeginn mit Hukyndra® alle für ihr Alter festgelegten

Impfungen auf den aktuellen Stand zu bringen. o Wenn Sie Hukyndra® während der Schwangerschaft bekommen haben, hat Ihr Säugling eventuell ein erhöhtes Risiko während der ersten 5 Monate nach der letzten Hukyndra®-Dosis, die Sie während der Schwangerschaft erhalten haben, eine Infektion zu bekommen. Es ist wichtig, dass Sie den Ärzten des Kindes und anderem Fachpersonal im Gesundheitswesen mitteilen, dass Sie Hukyndra® während der Schwangerschaft bekommen haben, sodass diese darüber entscheiden können, ob Ihr Säugling eine Impfung erhalten sollte.

<u>Herzschwäche</u>

• Wenn Sie eine leichte Herzschwäche (Herzinsuffizienz) haben und mit Hukyndra® behandelt werden, muss Ihre Herzschwäche sorgfältig durch Ihren Arzt überwacht werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt darüber informieren, wenn Sie schwerwiegende Herzprobleme haben oder gehabt haben. Entwickeln Sie neue oder sich verschlechternde Symptome einer Herzschwäche (z. B. Kurzatmigkeit oder Anschwellen der Füße), müssen Sie sofort mit Ihrem Arzt sprechen. Ihr Arzt wird dann entscheiden, ob Sie

Fieber, blaue Flecke, Blutungen, blasses Aussehen

Hukyndra® weiterhin erhalten sollten. Bei einigen Patienten kann die körpereigene Produktion von bestimmten Blutzellen vermindert sein. Diese Blutzellen helfen bei der Bekämpfung von

Infektionen oder beim Stoppen von Blutungen. Ihr Arzt wird möglicherweise

entscheiden, die Behandlung zu beenden. Wenn Sie anhaltendes Fieber

bekommen oder schwache blaue Flecke oder wenn Sie sehr leicht bluten oder sehr blass aussehen, benachrichtigen Sie sofort Ihren Arzt.

• Es gab sehr selten Fälle bestimmter Krebsarten bei Patienten (Kindern und Erwachsenen), die Adalimumab oder andere TNF-Hemmer erhielten. o Im Vergleich zu Menschen ohne Rheuma können Patienten, die seit langer Zeit eine schwerere rheumatoide Arthritis haben, ein erhöhtes Risiko haben, ein Lymphom oder Leukämie zu bekommen. Ein

ist eine Krebsform, die das Blut und das Knochenmark betrifft. o Wenn Sie Hukyndra® anwenden, kann sich Ihr Risiko, Lymphome, Leukämie oder andere Krebsformen zu entwickeln, möglicherweise erhöhen. In Ausnahmefällen wurde bei Patienten, die mit Adalimumab behandelt wurden, eine seltene und schwere Form des Lymphoms beobachtet. Einige dieser Patienten wurden gleichzeitig mit dem Wirkstoff Azathioprin oder 6-Mercaptopurin behandelt.

Lymphom ist eine Krebsform, die das Lymphsystem betrifft, Leukämie

o Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Azathioprin oder 6-Mercaptopurin zusammen mit Hukyndra® einnehmen.

o Bei Patienten, die mit Adalimumab behandelt wurden, wurden Fälle von Hauttumoren beobachtet. Unter diesen Tumoren waren keine Melanome. o Falls während oder nach der Behandlung neue Hautveränderungen auftreten oder sich das Aussehen bereits bestehender Hautverletzungen verändert, informieren Sie bitte Ihren Arzt.

• Bei Patienten mit einer besonderen Art von Lungenerkrankung, der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), sind unter Behandlung mit einem anderen TNF-Hemmer Krebsarten aufgetreten. Unter diesen Krebsarten waren keine Lymphome. Wenn Sie COPD haben oder wenn Sie stark rauchen, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, ob die Behandlung mit einem TNF-Hemmer für Sie geeignet ist.

Autoimmunerkrankung

• In seltenen Fällen kann die Behandlung mit Hukyndra® ein lupusähnliches Syndrom auslösen. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls Anzeichen wie ein anhaltender, nicht erklärbarer Hautausschlag, Fieber, Gelenkschmerzen oder Müdigkeit auftreten.

Kinder und Jugendliche

• Impfungen: Wenn möglich, sollten Kinder und Jugendliche vor Anwendung

Anwendung von Hukyndra® zusammen mit anderen Arzneimitteln Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel

einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden. Sie dürfen Hukyndra® nicht zusammen mit Arzneimitteln anwenden, die folgende

Wirkstoffe enthalten, da ein erhöhtes Risiko einer schwerwiegenden Infektion besteht: Anakinra

Abatacept

Hukyndra® kann zusammen angewendet werden mit: Methotrexat

• bestimmten krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (wie z.B. Sulfasalazin, Hydroxychloroquin, Leflunomid und injizierbaren Goldzubereitungen)

 Kortikosteroiden oder Schmerzmitteln, einschließlich nicht steroidhaltiger entzündungshemmender Antirheumatika (NSAR).

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

• Sie sollten eine geeignete Verhütungsmethode in Erwägung ziehen, um nicht schwanger zu werden, und bis mindestens 5 Monate nach der letzten

Dosis von Hukyndra® verhüten. • Wenn Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie Ihren Arzt zur Anwendung dieses Arzneimittels um Rat.

 Hukyndra® sollte während einer Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn dies erforderlich ist. Laut einer Studie mit Schwangeren bestand bei Kindern von Müttern,

die während der Schwangerschaft mit Adalimumab behandelt wurden, kein höheres Risiko für Geburtsfehler als bei Kindern von Müttern mit der gleichen Erkrankung, die nicht mit Adalimumab behandelt wurden. Hukyndra® kann während der Stillzeit angewendet werden. • Wenn Sie Hukyndra® während einer Schwangerschaft erhalten, hat Ihr

Säugling eventuell ein erhöhtes Risiko, eine Infektion zu bekommen. • Es ist wichtig, dass Sie vor einer Impfung Ihres Säuglings die Ärzte des Kindes und anderes Fachpersonal im Gesundheitswesen darüber informieren, dass Sie Hukyndra® während der Schwangerschaft

angewendet haben. Weitere Information siehe im Abschnitt zu Impfungen

unter "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen". Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

von Maschinen haben. Bei der Anwendung von Hukyndra® kann das Sehvermögen beeinträchtigt sein und es kann das Gefühl auftreten, dass sich der Raum dreht. Hukyndra® enthält Natrium

Hukyndra® kann einen geringen Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 0,8 ml Dosis, d.h., es ist nahezu "natriumfrei".

Plaque-Psoriasis

3. Wie ist Hukyndra® anzuwenden? Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie

Die nachfolgende Tabelle zeigt die empfohlenen Dosen von Hukyndra® in den genehmigten Anwendungen. Ihr Arzt kann Hukyndra® in einer anderen Stärke verschreiben, wenn Sie eine andere Dosierung benötigen.

Rheumatoide Ar	thritis	
Alter oder Körpergewicht	Wie viel und wie häufig zu verabreichen?	Hinweise
Erwachsene	40 mg jede zweite Woche	Bei rheumatoider Arthritis wird die Gabe von Methotrexat fortgesetzt. Falls Ihr Arzt entscheidet, dass Methotrexat nicht für Sie geeignet ist, kann Hukyndra® auch alleine angewendet werden.
		Falls Sie rheumatoide Arthritis haben und kein Methotrexat begleitend zu Ihrer Behandlung mi Hukyndra® erhalten, kann Ihr Arzt sich für eine Adalimumab- Gabe von 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche entscheiden.

Alter oder Körpergewicht	Wie viel und wie häufig zu verabreichen?	Hinweise
Erwachsene	80 mg als Anfangsdosis (eine 80-mg-Injektion), danach 40 mg jede zweite Woche, beginnend eine Woche nach der Anfangsdosis.	Wenn Sie unzureichend auf die Behandlung ansprechen, kann Ihr Arzt die Dosierung auf 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche erhöhen.
Hidradenitis sup	purativa (Acne invers	a)
Alter oder Körpergewicht	Wie viel und wie häufig zu verabreichen?	Hinweise
Erwachsene	160 mg als Anfangsdosis (als zwei Injektionen von 80 mg an einem Tag oder als eine 80-mg- Injektion pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), danach eine Dosis von 80 mg zwei Wochen später (eine 80- mg-Injektion). Nach zwei weiteren Wochen wird die Behandlung mit einer Dosis von 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche nach Anweisung Ihres Arztes fortgesetzt.	Es wird empfohlen, dass Sie an den betroffenen Stellen täglich eine antiseptische Waschlösung anwenden.
Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren und einem Gewicht von 30 kg oder mehr	Die empfohlene Anfangsdosis von Hukyndra® beträgt 80 mg (eine 80-mg- Injektion). Nach einer Woche werden 40 mg jede zweite Woche verabreicht.	Wenn Sie unzureichend auf die Behandlung mit Hukyndra® 40 mg jede zweite Woche ansprechen, kann Ihr Arzt die Dosierung auf 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche erhöhen. Es wird empfohlen, dass Sie an den betroffenen Stellen täglich eine antiseptische Waschlösung

g	einem Gewicht von 30 kg oder mehr	80 mg (eine 80-mg- Injektion). Nach einer Woche werden 40 mg jede zweite Woche verabreicht.	kann Ihr Arzt die Dosierung auf 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche erhöhen. Es wird empfohlen, dass Sie an den betroffenen Stellen täglich eine antiseptische Waschlösung anwenden.
	Morbus Crohn		
	Alter oder Körpergewicht	Wie viel und wie häufig zu verabreichen?	Hinweise
n 9	Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit einem Gewicht von 40 kg oder mehr	80 mg als Anfangsdosis (eine 80-mg-Injektion), danach zwei Wochen später 40 mg. Wenn ein schnelleres Eintreten der Wirkung erforderlich ist, kann der Arzt eine Anfangsdosis von 160 mg verschreiben (als zwei Injektionen von 80 mg an einem Tag oder als eine 80-mg- Injektion pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), gefolgt von 80 mg zwei Wochen später (eine 80-mg-später (eine 80-mg-später (eine 80-mg-später (eine später (eine spä	Der Arzt kann die Dosierung auf 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche erhöhen.

Injektion).

Danach ist die übliche

Dosis 40 mg jede

zweite Woche.

Der Hukyndra® 80 mg Fertigpen sollte bei Kindern und Kinder und Jugendlichen mit Morbus Crohn, die weniger als 40 kg Jugendliche zwischen 6 und wiegen, nicht angewendet werden, da es nicht möglich ist, geringere Dosen als 80 mg zu verabreichen. 17 Jahren und einem Gewicht unter 40 kg

Colitis ulcerosa		
Alter oder Körpergewicht	Wie viel und wie häufig zu verabreichen?	Hinweise
Erwachsene	160 mg als Anfangsdosis (entweder als zwei Injektionen von 80 mg an einem Tag oder als eine 80-mg-Injektion pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), danach eine Dosis von 80 mg zwei Wochen später (eine 80-mg-Injektion). Danach ist die übliche Dosis 40 mg jede zweite Woche.	Ihr Arzt kann die Dosierung auf 40 mg jede Woche oder 80 mg jede zweite Woche erhöhen.
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren mit einem Körpergewicht unter 40 kg	80 mg als Anfangsdosis (eine 80-mg-Injektion), danach eine Dosis von 40 mg zwei Wochen später (eine 40-mg- Injektion). Danach ist die übliche Dosis 40 mg jede zweite Woche.	Auch wenn Sie während der Behandlung 18 Jahre alt werden, sollten Sie Adalimumab weiterhin mit der üblichen Dosis spritzen
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren mit einem Körpergewicht von 40 kg oder mehr	160 mg als Anfangsdosis (entweder als zwei Injektionen von 80 mg an einem Tag oder als eine 80-mg-Injektion pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), danach eine Dosis von 80 mg zwei Wochen später (eine 80-mg-Injektion). Danach ist die übliche Dosis 80 mg jede zweite Woche.	Auch wenn Sie während der Behandlung 18 Jahre alt werden, sollten Sie Adalimumab weiterhin mit der üblichen Dosis spritzen
Nicht infektiöse Alter oder		Hinweise
Körpergewicht	Wie viel und wie häufig zu verabreichen?	
Erwachsene	80 mg als Anfangsdosis (eine 80-mg-Injektion), danach 40 mg jede zweite Woche, beginnend eine Woche nach der Anfangsdosis.	Kortikosteroide oder andere Arzneimittel, die das körpereigene Abwehrsystem beeinflussen, können während der Behandlung mit Hukyndra® weiter genommen werden. Hukyndra® kann auch alleine angewendet werden.
Kinder ab 2 Jahren und Jugendliche mit einem Gewicht von 30 kg oder mehr	40 mg jede zweite Woche	Ihr Arzt kann eine Anfangsdosis von 80 mg verschreiben. Diese Anfangsdosis wird eine Woche vor Beginn der Behandlung mit den üblichen 40 mg jede zweite Woche verabreicht. Es wird empfohlen, Hukyndra® gemeinsam mit

Art

We

Wei

• Gallenblasenentzündung, Gallensteine

Blutgerinnsel in einer Vene, Verstopfung eines Blutgefäßes Lungenerkrankungen, die sich in Kurzatmigkeit äußern (einschließlich Entzündung) • Lungenembolie (Verschluss in einer Lungenarterie)

 Nicht normale Ansammlung von Flüssigkeit in der Umgebung der Lunge (Pleuraerguss) Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die starke Schmerzen im Bauchraum

und Rücken verursacht Schluckstörungen Gesichtsschwellung

 Narbenbildung Abnormaler Muskelabbau • Systemischer Lupus erythematodes (einschließlich Entzündung von Haut, Herz, Lunge, Gelenken und anderen Organsystemen)

Schlafstörungen

Nächtliches Schwitzen

Fettleber

 Impotenz Entzündungen

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen) • Leukämie (Krebs, der das Blut und das Knochenmark betrifft)

	Injektionen von 80 mg an einem Tag oder als eine 80-mg-Injektion pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), danach eine Dosis von 80 mg zwei Wochen später (eine 80-mg-Injektion).	
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren	Dosis 40 mg jede zweite Woche. 80 mg als Anfangsdosis (eine 80-mg-Injektion),	Auch wenn Sie während der Behandlung 18 Jahre alt werden, sollten Sie Adalimumab weiterhin
mit einem Körpergewicht unter 40 kg	danach eine Dosis von 40 mg zwei Wochen später (eine 40-mg- Injektion).	mit der üblichen Dosis spritzen
Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren	Dosis 40 mg jede zweite Woche. 160 mg als Anfangsdosis (entweder als zwei	Auch wenn Sie während der Behandlung 18 Jahre alt werden, sollten Sie Adalimumab weiterhin
mit einem Körpergewicht von 40 kg oder mehr	Injektionen von 80 mg an einem Tag oder als eine 80-mg-Injektion pro Tag an zwei aufeinanderfolgenden Tagen), danach eine Dosis von 80 mg zwei Wochen später (eine 80-mg-Injektion).	mit der üblichen Dosis spritzen
	Danach ist die übliche Dosis 80 mg jede zweite Woche.	
Nicht infektiös Alter oder Körpergewich	Wie viel und wie häufig	Hinweise
Erwachsene	80 mg als Anfangsdosis (eine 80-mg-Injektion), danach 40 mg jede zweite Woche, beginnend eine Woche nach der Anfangsdosis.	Kortikosteroide oder andere Arzneimittel, die das körpereigene Abwehrsystem beeinflussen, können während der Behandlung mit Hukyndra® weiter genommen werden. Hukyndra® kann auch alleine
Kinder ab 2 Jahren und Jugendliche mit einem Gewicht von 30 kg oder mehr	40 mg jede zweite Woche	angewendet werden. Ihr Arzt kann eine Anfangsdosis von 80 mg verschreiben. Diese Anfangsdosis wird eine Woche vor Beginn der Behandlung mit den üblichen 40 mg jede zweite Woche verabreicht. Es wird empfohlen, Hukyndra® gemeinsam mit
Art der Anwen Hukvndra® wird	dung unter die Haut injiziert (sul	Methotrexat anzuwenden.
Eine genaue Ai Abschnitt 7 "A	nleitung wie Hukyndra® nweisung für die Anwen	injiziert wird, finden Sie in
Falls Sie Hukynd verordnet hat, ir	ra® versehentlich häufiger	injiziert haben, als der Arzt Ihnen der Apotheker darüber. Nehmen Sie
Wenn Sie die I Wenn Sie einma Hukyndra®-Dosis darauffolgende I hätten, wenn Sie	njektion von Hukyndra® I eine Injektion vergessen h s spritzen, sobald Ihnen die Dosis an dem ursprünglich e die Injektion nicht verges	vergessen haben naben, sollten Sie die nächste es auffällt. Spritzen Sie Ihre vorgesehenen Tag, wie Sie es getan sen hätten.
Die Entscheidun Ihrem Arzt besp	rechen. Die Anzeichen Ihre handlung mit Hukyndra® ab	yndra® abzubrechen, müssen Sie mit r Erkrankung können zurückkehren,
		lich2
Sie sich an Ihrer 4. Welche Ne Wie alle Arzneim	benwirkungen sind mög nittel kann auch dieses Arzr	neimittel Nebenwirkungen haben,
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande	nittel kann auch dieses Arzr ei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtige folgenden Anz • Starker Hau	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreieichen bemerken utausschlag, Nesselsucht och sie den ben bestelt des sie den bestelt des sie des sie des sie des sie des sie des sie den bestelt des sie des sie des sie des sie den bestelt des sie de	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. en Arzt, wenn Sie eines der
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtige folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder Schleiten beim Atmen oder Schleiten beim Atmen oder Schleiten beim Atmen oder Schleiten sein seiten die seiten der Schleiten beim Atmen oder Schleiten Beim Atmen Beiten Beiten Beiten Beim Atmen Beiten Be	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihre zeichen bemerken utausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen ode ziten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögligeichen bemerken ziener Infektion wie Fieber, Keiner Infektion wie Fi	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden,
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihre zeichen bemerken utausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen ode eiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögligeichen bemerken	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden,
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnproblei Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule o Anzeichen u des blutbild	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihre eichen bemerken utausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder iten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlaschwäche oder Müdigkeit en Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen,	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnproblei Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule e Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreieichen bemerken utausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder iten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlaschwäche oder Müdigkeit en Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen nt abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnproblei Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule e Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschraufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreieichen bemerken Itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder it bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlaßchwäche oder Müdigkeit en Armen oder Beinen Die oder offene Stellen, die nich ind Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein Juckreiz)	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) eschließlich Schmerz, Schwellung,
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode Infektionen Infektion de Kopfschmer Bauchschmer Bauchschmer Bauchschmer Ubelkeit und	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreizichen bemerken it ausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder it bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliziehen bemerken einer Infektion wie Fieber, kine, Brennen beim Wasserlaschwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein r Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen derbrechen	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) ischließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen,
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnproblet Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule e Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode Infektionen Infektion de Kopfschmer Buckeit und Kopfschmer Buckeit und Hautaussch Schmerzen Häufig (kann Schwere Infektionen	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyten Sie unverzüglich Ihreteichen bemerken Itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder iten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlaßchwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen Oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein r Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Bluffektionen (einschließlich Bluffektion	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) eschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, genentzündung)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektionen Ubelkeit und Kopfschmer Bauchschme Übelkeit und Hautaussch Schmerzen Häufig (kann Schwere Infektionen Unfektionen Unfektionen Unfektionen Unfektionen Unfektionen Unfektionen Unfektionen Unfektionen	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreizichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder eiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie möglitzeichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlichen Geham der Müdigkeit ein Armen oder Beinen nach der offene Stellen, die nich ind Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behan der Injektionsstelle (ein Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen der Haut von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Blüonen (einschließlich Blü	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) ischließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) en betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utzündung des Unterhautzellgewebes
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode Infektionen Infektionen Ubelkeit und Hautaussch Schmerzen Häufig (kann Schwere Infektionen	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder eiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserle Schwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein r Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich efektion ein ein ein ein ein ein ein ein ein ei	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) ischließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) en betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utzündung des Unterhautzellgewebes
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnproblet Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule e Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektionen Ubelkeit und Kopfschmer Buchschmer Buchschmer Hautaussch Schmerzen Häufig (kann Schwere Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Unfektionen Harnwegsin Pilzinfektion Gelenkinfek Gutartige Tu Hautkrebs Allergische	ittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Huky en Sie unverzüglich Ihreieichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder iten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlaßchwäche oder Müdigkeit en Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein r Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Bluonen (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich en ten tionen umoren Reaktionen (einschließlich Glich der Fortpflanzungsorgane fektion in muskeln (einschließlich en ten tionen umoren Reaktionen (einschließlich Glich Glich ein tionen umoren Reaktionen (einschließlich Glich Glich ein tionen umoren Reaktionen (einschließlich Glich Glich Glich ein tionen umoren Reaktionen (einschließlich Glich Gli	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) uschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) en betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigket Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektionen Unfektionen	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Huky en Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen odersten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, kine, Brennen beim Wasserlaßechwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich ind Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung en erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich en tionen umoren Reaktionen (einschließlich en twerlust (Dehydratation) schwankungen (einschließlich en werlust (Dehydratation) schwankungen (einschließlich en werlust (Dehydratation) schwankungen (einschließlich en twerlust (Dehydratation)	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) ischließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Int betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode Infektionen Infektionen Ubelkeit und Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Harnwegsin Pilzinfektion Gelenkinfek Gutartige To Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstafstörur Empfindung Migräne Nervenwurz und Beinsch Schstörunger Nervenwurz und Beinsch Sehstörunger	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreieichen bemerken Itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlichen bemerken einer Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich ind Krankheitserscheinungenden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Blonen (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich en ein ein ein ein ein ein ein ein ein	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) schließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, genentzündung) Int betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utzendung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen Anz Anzeichen Erine Beule Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen udes blutbild Blutungen, Die oben beschraufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektion de Kopfschmer Bauchschmer Bauchschmer Bauchschmer Bauchschmer Hautaussch Schmerzen Häufig (kann Schwere Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Ubelkeit und Kopfschmer Bauchschmer Bauc	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyten Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken stausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder eiten beim Atmen oder Schlitt bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie möglitteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlichen bemerken einer Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich Krankheitserscheinunge enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behand en Gernen ein Armwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lungzen erzen der Febrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Bluoter Fortpflanzungsorgane fektion ein ein ein ein ein ein ein ein ein ei	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) uschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) en betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utvergiftung und Fließerbläschen) en betreffen) utvergiftung und Fließerbläschen) der betreffen) utvergiftung und Fließerbläschen) en betreffen) utvergiftung und Fließerbläschen)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschraufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Hautaussch Schwerzen Häufig (kann Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Ubelkeit und Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Schlafstörun Empfindung Nigrane Nigrane Nigrane Nigrane Nigrane Schwindel Schwindel	nittel kann auch dieses Arzrei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihre zeichen bemerken stausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder it bei körperlicher Aktivität och en sie so bald wie mögliteichen bemerken siener Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserk Schwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein r Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen derberechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Bloonen (einschließlich En ose) des Mundes (einschließlich der Fortpflanzungsorgane fektion ein ein ein ein ein ein ein ein ein ei	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der drankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) uschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) en betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utvergiftung und Fließschnupfen, jenentzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) iss, einschließlich Rückenschmerzen
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen E Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule G Anzeichen L des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Rötung ode Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Hautaussch Schwere Inf	ititel kann auch dieses Arzra ig jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Huky en Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder ite beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken in Armen oder Beinen Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlaßchwäche oder Müdigkeit en Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Beh an der Injektionsstelle (ein r Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lungzen erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Blonen (einschließlich Blonen (einschließlich Blonen (einschließlich Enose) des Mundes (einschließlich Enose) des Mundes (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Enose) des Mundes (einschließlich Krelkompression (Hexenschumerzen) ein den störungen (einschließlich Krelkompression (Hexenschumerzen) ein den Störungen (einschließlich Krelkompression (Hexenschumerzen) ein des Augenlides und Anschliruck	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der drankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) uschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) en betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utvergiftung und Fließschnupfen, jenentzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) iss, einschließlich Rückenschmerzen
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigke Kurzatnigke Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Ubelkeit und Hautaussch Schmerzen Kaufig (kann Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Harnwegsin Pilzinfektion Gelenkinfek Gutartige Tu Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Schlafstörun Empfindung Migräne Nerdenungs Augen-Darr Hautergüsse Husten Asthma Kurzen-Darr Verdauungs Saures Aufs Sicca-Syndr Juckender H Suckender H	itittel kann auch dieses Arzreigiedem auftreten müssen, ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Huky en Sie unverzüglich Ihreiseichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder iten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlichen bemerken beimer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlichen oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behan der Injektionsstelle (ein r. Juckreiz) der Atemwege (einschließlich En onen (einschließlich Bloonen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Bloonen (einschließlich En onen (einschließlich En onen (einschließlich En onen (einschließlich En onen (einschließlich Kreikompression (Hexenschungen störungen (einschließlich Kreikompression (Hexenschungen störungen (einschließlich Kreikompression (Hexenschungen des Augenlides und Anschließlich kreikompression (Hexenschungen des Augenließlich kreikompression (Hexenschungen des Augenließlich kreikompression (Hexensch	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) ischließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Int betreffen) Utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) Utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) Utvergiftung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) iss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigke Kurzatnigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen Anz Anzeichen Ezahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektionen Infektionen Ubelkeit und Kopfschmer Bauchschmer Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (kann Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr Bauchschmen Kopfschmer Bauchschmen Hölteinen Infektionen Infekt	ititel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken utausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen ode eiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, kime, Brennen beim Wasserläschwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen en der Injektionsstelle (ein Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lungzen erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich En Gese) des Ohres des Mundes (einschließlich Kreikonen (einsc	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) schließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Interpretation und Virusgrippe) -Darm-Grippe) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) sss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges
4. Welche New Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtigfolgenden Anzeichen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtigfolgenden Anzeichen Ezahnprobler Gefühl der Schwäche ir Eine Beule Geschwäche ir Eine Beule Geschwächen Gelenkinfektionen Infektionen Inf	itittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukten Sie unverzüglich Ihreicichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserläschwäche oder Müdigkeit en Armen oder Stellen, die nich Ind Krankheitserscheinungenden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behan der Injektionsstelle (ein zu Juckreiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lungzen erzen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich Kreikompression (Hexenschungen störungen (einschließlich Kreikompression (Hexenschungen der Haut (wie z. B. Ekzem nen umoren Reaktionen (einschließlich trockenschungen (einschließlich kreikompression (Hexenschungen des Augenlides und Anschließlich Ger und stößen om (einschließlich trockenschungen (einschließlich kreikompression (Hexenschungen des Augenlides und Anschließlich Ger und en der Haut (wie z. B. Ekzem nen der haut	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) schließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Jen betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) sss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen Anz Anzeichen Anz Anzeichen Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen L Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen L des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen L des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (kann Sehr häufig (kann Schwerzen Häufig (kann Hautwerzen Häufig (kann Hautwerzen Häufig (kann Hautwerzen Häufig (kann Hautwerze	ittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken utausschlag, Nesselsucht od Reaktion im Gesicht, an Händen ode itten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität oder Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlichwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinunge enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behandelte Fieberechen lag in Muskeln und Knochen beis zu 1 von 10 Behandelte Fiektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Kelkompression (Hexenschungen ein en	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der Ider andere Anzeichen einer Ider im Liegen oder Schwellung der Füßen ucken Ider im Liegen oder Schwellung der Füße Ider im Liegen oder Schwellung der Füße Ider im Liegen oder Schwellung der Füße Ider im Liegen oder Schwellung der Grankheitsgefühl, Wunden, In abheilen In die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend Immab beobachtet wurden. In andelten betreffen) Ischließlich Schmerz, Schwellung, Ich Erkältung, Fließschnupfen, Iden betreffen) Intergiftung und Virusgrippe) Inden betreffen) Intergiftung und Virusgrippe) Interpolation und Fieberbläschen) Interpolation und Fieberbläschen) Interpolation der Taubheitsgefühl) Interpolation der Taubheitsgefühl I
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatnigker Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Harnwegsin Pilzinfektion Gelenkinfek Gutartige Tu Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Schlafstörun Empfindung Migräne Nervenentzun Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektion	nittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreiteichen bemerken it ausschlag, Nesselsucht od Reaktion im Gesicht, an Händen ode itten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität oder Sie so bald wie mögliteichen bemerken it einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlaßchwäche oder Müdigkeit schwäche schwächen die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Miger von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Kielkompression (Hexenschumerten) ein störungen (einschließlich Kielkompression (Hexenschumerten) ein störungen (einschließlich Kielkompression (Hexenschumerten) ein mudung des Augenlides und Anschwätzen störungen (einschließlich Kielkompression (Hexenschumerten) ein men gen störungen (einschließlich kielkompression (Hexenschumerten) ein mit störung (Magenverstimmunitäten und Kielkompression (Hexenschumerten) ein mit störung (Magenverstimmunitätelle und Fielkompression (Hexenschumerten) ein ein gen set ein gen störungen (einschließlich trockene der Haut (wie z. B. Ekzem gen	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken ler im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) sschließlich Schmerz, Schwellung, sich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Int betreffen) Intergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) Tytzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) ss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges ang, Blähungen, Sodbrennen) er Augen und trockenem Mund) er) g von Schuppenflechte (Psoriasis)
4. Welche Ne 4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnproblet Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschraufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen I	ittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen, ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreichen bemerken itausschlag, Nesselsucht og Reaktion im Gesicht, an Händen odeiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität og en Sie so bald wie mögliteichen bemerken siner Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserkschwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Stellen, die nich die Krankheitserscheinungenden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Atemwege (einschließlich Bloonen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Enose) des Mundes (einschließlich Kreikompression (Hexenschunder Fortpflanzungsorgane fektion en umoren Reaktionen (einschließlich konten der Haut (wie z. B. Ekzem nien tionen umoren) Reaktionen (einschließlich konten der Haut (wie z. B. Ekzem nien störung (Magenverstimmunt in des Augenlides und Anschließlich Gen on (einschließlich konten der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der Haut (wie z. B. Ekzem nien umoren) Reaktionen (einschließlich trocken der haut (einschließlich trocken der haut (einschließlich trocken der haut (einschließlich trocken der haut (einschließlich viel haut der haut (einschließlich viel haut der haut (einschließlich viel haut der haut (einschli	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer er Füßen ucken ler im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) sschließlich Schmerz, Schwellung, sich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Int betreffen) Intergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) Tytzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) ss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges ang, Blähungen, Sodbrennen) er Augen und trockenem Mund) er) g von Schuppenflechte (Psoriasis)
4. Welche New Wie alle Arzneim die aber nicht be eicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen e Zahnprobler Gefühl der S Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule e Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule e Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Harnwegsin Pilzinfektion Gelenkinfek Gutartige Ti Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs Augenentzu Augeninder Hoher Blutd Hitzegefühl Blutergüsse Hastn Schlafstörur Empfindung Migräne Nerveneurz und Bstörung Schuster Schwindel Herrasen Hoher Blutd Hitzegefühl Blutergüsse Hastn Blutergüsse Hastn Schlafstörur Empfindung Migräne Nerveneurz und Brüchige Fir Verdauungs Saures Aufs Scicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Saures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Saures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Saures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Saures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Saures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Scaures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Schafstörung Saures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Entzündung Scaures Aufs Sicca-Syndr Juckreiz Juckender H Blatz Flecke Schurcher Blatz Flecke Blatz Flecke Blatz Flecke Verzögerte Gelegentlich (Tuberkulose Bentzeindung Brüchige Fir Vermehrtes Haarausfall Neuer Ausb	nittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreichen bemerken it ausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen odeiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie möglitzeichen bemerken einer Infektion wie Fieber, Kime, Brennen beim Wasserlächwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinunge einer Infektionsstelle (ein Tuskeiz) der Atemwege (einschließler Nasennebenhöhlen, Lung zen erzen der Erbrechen lag in Muskeln und Knochen bis zu 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich En ose) des Ohres des Mundes (einschließlich Kreikion ein tionen umoren Reaktionen (einschließlich Kreikion ein ein tionen gen störung (Magenverstimmuntstößen en en tionen um Fieben ein störung (Magenverstimmuntstößen ein ein des Augenlides und Anschließlich kreikion ein ein mindung des Augenlides und Anschließlich kreikion ein ein des Augenlides und Anschließlich der Fortpflanzungsorgane fektion ein ein ein den dander Infektionen, der Blutungen störung (Magenverstimmuntstößen ein ein ein dandere Infektionen, die kann bis zu 1 von 100 Behander und andere Infektionen, die kann bis zu 1 von 100 Behander ein ein die die kann bis zu 1 von 100 Behander ein ein die kinnen in ein die kinnen in ein die kinnen in ein ein ein ein ein ein ein ein	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der drankheitsgefühl, Wunden, dessen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend dimumab beobachtet wurden. andelten betreffen) ischließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Int betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) iss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges den des Auges den Hinweis sein auf die Nickenschmerzen wellen des Auges der Augen und trockenem Mund)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen e Zahnprobler Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen u des blutbild Blutungen, Die oben beschr aufgelisteten Ne Sehr häufig (k Reaktionen Infektionen Inf	nittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen, ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen Sie unverzüglich Ihreiseichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen odeiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, kme, Brennen beim Wasserlschwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich und Krankheitserscheinungen enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Bluonen (einschließlich Bluonen (einschließlich Bluonen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Haut (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Enose) des Mundes (einschließlich Kreiktonen (einschließ	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) sschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Interpretation und Virusgrippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) ss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges und Hückenschmerzen wellen des Auges ch erhöhtes Risiko für Blutungen oder andelten betreffen) ur Augen und trockenem Mund) en der Augen und trockenem Mund)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be eicht bis mäßig müssen behande Von ate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schwierigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Anzeichen Gefühl der S Husten Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen udes blutbild Blutungen, Die oben beschr ufgelisteten Ne Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen udes blutbild Blutungen, Die oben beschr ufgelisteten Ne Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen udes blutbild Blutungen, Die oben beschr ufgelisteten Ne Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen udes blutbild Blutungen, Die oben beschr ufgelisteten Ne Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen udes blutbild Blutungen, Die oben beschr ufgelisteten Ne Schwäche ir Eine Beule G Anzeichen und Greteln Ubelkeit und Kopfschmer Bauchschem Ubelkeit und Kopfschmer Buchschen Ubelkeit und Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Und Gürtelr Infektionen Infektio	nittel kann auch dieses Arzei jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen en Sie unverzüglich Ihrezeichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen odeiten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och sie so bald wie mögliteichen bemerken iner Infektion wie Fieber, Kme, Brennen beim Wasserlächwäche oder Müdigkeit schwäche oder Systems hinweisen, Blässe siebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behandelte Fektionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Kreikompression (Hexenschumeren) störung (Magenverstimmustößen om (einschließlich kreikomen (einschließlich kreinen (einschließlich kreikomen	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und n können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der Grankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) sschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Interpretation und Virusgrippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) ss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges und Hückenschmerzen wellen des Auges ch erhöhtes Risiko für Blutungen oder andelten betreffen) ur Augen und trockenem Mund) en der Augen und trockenem Mund)
4. Welche Ne Wie alle Arzneim die aber nicht be leicht bis mäßig müssen behande Monate nach der Benachrichtig folgenden Anz Starker Hau allergischen Schwellung Schweilung Schweinigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Schweinigke Kurzatmigke Benachrichtig folgenden Anz Schweinigke Kurzatmigke Gefühl der Schwichen Gefühl der Schwäche in Eine Beule Gefühl der Schwäche in Eine Beule Geschwäche in Kribbeln Taubheit Doppeltsehe Schwäche in Eine Beule Geschwäche in Eine Beule Geschwäche in Eine Beule Geschwäche in Eine Beule Geschwächen Ubelkeit und Kopfschmer Bauchschme Ubelkeit und Kopfschmer Bauchschme Ubelkeit und Hautaussch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Harnwegsin Pilzinfektion Gelenkinfekt Gutartige Tu Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Schlafstörun Empfindung Migräne Nervenwurz und Beinsch Schwindel Hetzrasen Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Schlafstörun Empfindung Migräne Nervenwurz und Beinsch Schwindel Hetzrasen Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Blutartige Tu Hautkrebs Allergische Flüssigkeits Stimmungs: Angstgefühl Schlafstörun Empfindung Migräne Nervenwurz und Beinsch Schwere Inf Darminfekti Infektionen Infektionen Infektionen Infektionen Hartwegsin Pilzinfektion Schwere Inf Darminfekti Huterg Blutd Huterg Blutd Huterg Schwindel Herzproblem Hararausfall Neuer Ausb Muskelkräm Blut im Urin Nierenprobl Schmerzen Wasseransa Fieber Verringerun blaue Flecke Entzünlung Krebs Krebs, der G Melanom Immunstöru Waskelkräm Blut im Urin Nierenproble Schlaganfal Herzproblem Herzp	nittel kann auch dieses Arzrie jedem auftreten müssen. ausgeprägt. Einige können elt werden. Nebenwirkunger letzten Injektion von Hukyen en Sie unverzüglich Ihrewichen bemerken itausschlag, Nesselsucht och Reaktion im Gesicht, an Händen oder iten beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken itausen beim Atmen oder Schlit bei körperlicher Aktivität och en Sie so bald wie mögliteichen bemerken einer Infektion wie Fieber, könen, Brennen beim Wasserlischwäche oder Müdigkeit schwäche oder Müdigkeit schwäche oder Müdigkeit ein Armen oder Beinen oder offene Stellen, die nich ind Krankheitserscheinunge enden Systems hinweisen, Blässe iebenen Anzeichen können benwirkungen, die mit Ada ann mehr als 1 von 10 Behandelte fektionen (einschließlich Blionen (einschließlich Blionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Blionen (einschließlich Magen der Haut (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Enose) des Ohres des Mundes (einschließlich Kelkonen (einschließlich Kelko	neimittel Nebenwirkungen haben, Die meisten Nebenwirkungen sind jedoch auch schwerwiegend sein und können noch mindestens bis vier yndra® auftreten. In Arzt, wenn Sie eines der der andere Anzeichen einer der Füßen ucken der im Liegen oder Schwellung der Füße ch Ihren Arzt, wenn Sie eines der drankheitsgefühl, Wunden, assen Int abheilen en, die auf eine mögliche Erkrankung wie anhaltendes Fieber, Blutergüsse, ein Hinweis sein auf die nachfolgend limumab beobachtet wurden. andelten betreffen) sschließlich Schmerz, Schwellung, ich Erkältung, Fließschnupfen, jenentzündung) Int betreffen) utvergiftung und Virusgrippe) -Darm-Grippe) tzündung des Unterhautzellgewebes Zahninfektionen und Fieberbläschen) durch Jahreszeiten bedingte Allergie) ch Depression) ribbeln, Prickeln oder Taubheitsgefühl) ss, einschließlich Rückenschmerzen wellen des Auges ung, Blähungen, Sodbrennen) er Augen und trockenem Mund) e) g von Schuppenflechte (Psoriasis) ch erhöhtes Risiko für Blutungen oder andelten betreffen) er auftretunisienen Infektionen iraler Hirnhautentzündung) ms (Divertikulitis) ch erhöhtes Risiko für Blutungen oder andelten betreffen) er auftretung wenen Infektionen iraler Hirnhautentzündung) ms (Divertikulitis) ch erhöhtes Risiko für Blutungen oder andelten betreffen) er auftretung wenen Infektionen iraler Hirnhautentzündung) ms (Divertikulitis)

• Schwere allergische Reaktionen mit Schock Multiple Sklerose · Nervenerkrankungen (z. B. Entzündung des Augennervs und Guillain-Barré-Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/der Blisterpackung/ Syndrom, das zu Muskelschwäche, gestörten Sinnesempfindungen, Kribbeln dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das in Armen und Oberkörper führen kann) Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Herzstillstand • Lungenfibrose (Narbenbildung in der Lunge) Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C). Nicht einfrieren. Darmwanddurchbruch Hepatitis Den Fertigpen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. • Erneuter Ausbruch von Hepatitis B • Entzündung der Leber, die durch das körpereigene Abwehrsystem ausgelöst Alternative Lagerung: Wenn erforderlich (zum Beispiel, wenn Sie verreisen), darf ein einzelner wird (Autoimmunhepatitis) Hukyndra®-Fertigpen auch bei 20 °C bis 25 °C für einen Zeitraum von maximal Entzündung der Blutgefäße der Haut (kutane Vaskulitis) 30 Tagen aufbewahrt werden - achten Sie darauf, ihn vor Licht zu schützen. • Stevens-Johnson-Syndrom (frühe Anzeichen sind Unwohlsein, Fieber, Sobald Sie den Pen erst einmal aus dem Kühlschrank genommen haben, um Kopfschmerzen und Hautausschlag) ihn bei 20 °C bis 25 °C zu lagern, müssen Sie ihn innerhalb dieser 30 Tage Gesichtsschwellung (Ödem) in Verbindung mit allergischen Reaktionen verbrauchen oder wegwerfen, auch wenn Sie den Pen in den Kühlschrank Entzündlicher Hautausschlag (Erythema multiforme) zurücklegen. Lupusähnliches Syndrom • Angioödem (lokalisierte Schwellung der Haut) Sie sollten sich das Datum notieren, an dem Sie den Pen das erste Mal aus dem • Lichenoide Hautreaktion (juckender, rötlicher bis violetter Hautausschlag) Kühlschrank nehmen. Auch sollten Sie sich das Datum notieren, zu dem Sie den Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der vorliegenden Daten nicht abschätzbar Pen wegwerfen müssen, Hepatosplenales T-Zell-Lymphom (ein selten auftretender Blutkrebs, der oft Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht, wenn die Flüssigkeit trüb oder verfärbt tödlich ist) ist oder Flocken oder Partikel enthält. Merkelzellkarzinom (eine Art von Hautkrebs) • Kaposi-Sarkom, eine seltene Krebserkrankung, die mit einer Infektion mit Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie dem humanen Herpesvirus 8 assoziiert ist. Das Kaposi-Sarkom tritt am Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr häufigsten in Form von violetten Hautläsionen auf. verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. • Verschlechterung einer sogenannten Dermatomyositis (tritt als 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen Hautausschlag in Verbindung mit Muskelschwäche in Erscheinung) Gewichtszunahme (bei den meisten Patienten war die Gewichtszunahme gering) Was Hukyndra® enthält Der Wirkstoff ist: Adalimumab Mit Adalimumab wurden einige Nebenwirkungen beobachtet, die keine Anzeichen Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid, Saccharose, Polysorbat 80, haben und nur durch Bluttests erkannt werden können. Dazu gehören: Wasser für Injektionszwecke, Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes), Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-Wertes). **Sehr häufig** (kann mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen) Verringerte Anzahl weißer Blutkörperchen Wie Hukyndra® aussieht und Inhalt der Packung • Verringerte Anzahl roter Blutkörperchen Hukyndra® 80 mg Injektionslösung im Fertigpen wird als sterile Lösung von 80 mg Erhöhte Blutfettwerte • Erhöhte Werte für Leberenzyme Adalimumab in 0,8 ml Lösung geliefert. Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen) Der Hukyndra®-Fertigpen enthält 0,8 ml Injektionslösung in einem vorgefüllten, nadelbasierten Injektionssystem (Autoinjektor), das eine vorgefüllte Glasspritze mit • Erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen einer festen Nadel und einem Kolbenstopfen (Brombutylkautschuk) beinhaltet. Der • Verringerte Anzahl von Blutplättchen Pen ist ein mechanisches Injektionsgerät für den Einmalgebrauch, das in der Hand • Erhöhte Harnsäurewerte gehalten wird. • Abnormale Blutwerte für Natrium • Niedrige Blutwerte für Kalzium Jede Packung enthält 1 oder 3 Fertigpens verpackt in einer Blisterpackung mit 1 Niedrige Blutwerte für Phosphat oder 3 Alkoholtupfern. Hohe Blutzuckerwerte • Hohe Blutwerte für Lactatdehydrogenase Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht. Nachweis von Autoantikörpern im Blut Hukyndra® kann als Fertigspritze und/oder als Fertigpen erhältlich sein. • Hypokaliämie (Kaliummangel im Blut) **Pharmazeutischer Unternehmer** Hersteller **Gelegentlich** (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen) STADA Arzneimittel AG Alvotech Hf • Erhöhte Bilirubin-Konzentration im Blut (Leberwerte) Stadastraße 2-18 Sæmundargata 15-19 **Selten** (kann bis zu 1 von 1.000 Behandelten betreffen) 61118 Bad Vilbel Reykjavik, 101 • Verringerte Anzahl weißer und roter Blutkörperchen und geringe Zahl an Island Deutschland Blutplättchen Falls Sie weitere Informationen über dieses Arzneimittel wünschen, setzen Sie Meldung von Nebenwirkungen sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Verbindung: Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem/der Deutschland Österreich STADAPHARM GmbH STADA Arzneimittel GmbH **Deutschland:** Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Bundesinstitut für Impfstoffe und Tel: +49 61016030 Tel: +43 136785850 biomedizinische Arzneimittel Gesundheitswesen Paul-Ehrlich-Institut Traisengasse 5 Belgien/Luxemburg Paul-Ehrlich-Str. 51-59 1200 Wien EG (Eurogenerics) NV Fax: + 43 (0) 50 555 36207 63225 Langen Tel: +32 2 4797878 Tel: +49 6103 77 0 Website: www.basg.gv.at Fax: +49 6103 77 1234 Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2024. Website: www.pei.de **Weitere Informationsquellen** Belgien: Luxemburg: Föderalagentur für Arzneimittel und Centre Régional de Pharmacovigilance Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten Gesundheitsprodukte de Nancy oder Abteilung Pharmazie der Europäischen Arzneimittel-Agentur verfügbar: https://www.ema.europa.eu/. und Medikamente (Division de la www.afmps.be pharmacie et des médicaments) der Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel, einschließlich eines Videos Abteilung Vigilanz Gesundheitsbehörde in Luxemburg zur Anwendung des Fertigpens, sind durch Scannen des nachstehenden oder auf Website: www.notifieruneffetindesirable.be Website: www.guichet.lu/pharmakovigilanz dem Umkarton abgebildeten QR Codes mit einem Smartphone verfügbar. Die e-mail: adr@fagg-afmps.be gleichen Informationen finden Sie auch unter der folgenden Internetadresse: hukyndrapatients.com. anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt 5. Wie ist Hukyndra® aufzubewahren? STADA 9358058 Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. DE/AT 7. Anweisung für die Anwendung **Wichtige Informationen** Wie ist der Hukyndra®-Fertigpen Hukyndra®-Fertigpen Hukyndra® (Adalimumab)-Fertigpen Verwenden Sie den Fertigpen nicht und wenden Sie für den 80 mg/0,8 ml Injektionslösung, sich an Ihre medizinische Fachkraft oder den Einmalgebrauch zur subkutanen Anwendung Apotheker, wenn: aufzubewahren? die Flüssigkeit trüb oder verfärbt ist, oder Lesen Sie die Anweisung für die grauer Griffbereich Lagern Sie den wenn Sie darin Flocken oder Teilchen sehen. Anwendung sorgfältig durch, bevor Sie den Hukyndra®-Fertigpen für das Verfalldatum abgelaufen ist, Hukyndra®-Fertigpen für den Einmalgebrauch den Einmalgebrauch im • der Fertigpen direktem Sonnenlicht ausgesetzt war, Originalkarton im anwenden. · der Fertigpen heruntergefallen oder beschädigt ist. Kühlschrank bei 2 °C bis Vor der Injektion: 8 °C. Bei Bedarf, z. B. Nehmen Sie die durchsichtige Kappe bis unmittelbar wenn Sie auf Reisen sind, vor der Injektion nicht ab. Bewahren Sie den Ihre medizinische Fachkraft sollte Ihnen vor der ersten können Sie den Hukyndra®-Fertigpen für Kinder unzugänglich auf. Sichtfenster Anwendung zeigen, wie Sie den Hukyndra®-Fertigpen Hukyndra®-Fertigpen auch Lesen Sie alle Seiten der Anweisung für die anwenden. bis zu **30 Tage** bei 20 °C Anwendung durch, bevor Sie den Hukyndra®-Fertigpen Wenn Sie in der Vergangenheit einen anderen auf dem bis 25 °C aufbewahren. orangefarbene Nadelschutzhülse für den Einmalgebrauch verwenden. Markt befindlichen Adalimumab-Pen verwendet haben, ---- Nadel Weitere Informationen funktioniert dieser Pen anders als andere Pens. Bitte finden Sie im Abschnitt 5 lesen Sie diese Anweisung für die Anwendung der Gebrauchsinformation. vollständig durch, damit Sie vor der Injektion verstehen, durchsichtige Kappe wie Sie den Hukyndra®-Fertigpen richtig verwenden. Nehmen Sie den Hukyndra®-Fertigpen aus Überprüfen Sie das Verfalldatum, dem Kühlschrank und lassen Sie ihn bei legen Sie die benötigten **Auswahl und Reinigung** 20 °C-25 °C für 15 bis 30 Minuten liegen, Gegenstände bereit und der Injektionsstelle SCHRITT SCHRITT bevor Sie injizieren. waschen Sie die Hände. Schritt 2a. Überprüfen Sie das Schritt 1a. Nehmen Sie den Schritt 3a. Wählen Sie eine EXP: MM/JJJJ Verfalldatum auf dem Etikett des Hukyndra®-Fertigpen aus dem Kühlschrank Injektionsstelle (siehe Abbildung F): Fertigpen (siehe Abbildung C). (siehe Abbildung A). • an der Vorderseite Ihrer Oberschenkel oder, Verwenden Sie den Fertigpen nicht, Schritt 1b. Lassen Sie den wenn das Verfalldatum abgelaufen ist. • eine Stelle an Ihrem Bauch, Hukyndra®-Fertigpen bei 20 °C-25 °C für 15 bis 30 Minuten liegen, bevor sie injizieren die mindestens 5 cm von Ihrem Schritt 2b. Stellen Sie die folgenden (siehe Abbildung B). Gegenstände auf einer sauberen, ebenen Abbildung C Nabel (Bauchnabel) entfernt ist. Oberfläche bereit (siehe Abbildung D): • mindestens 3 cm von der • Entfernen Sie nicht die durchsichtige Kappe, während **Abbildung A** • 1 Hukyndra®-Fertigpen und Alkoholtupfer, letzten Injektionsstelle entfernt. der Hukyndra®-Fertigpen eine Temperatur von 20 °C-25 °C 1 Wattebausch oder Mulltupfer (nicht Schritt 3b. Wischen Sie die enthalten), Injektionsstelle in einer kreisenden Abbildung F Erwärmen Sie den Hukyndra®-Fertigpen nicht Stichfester Entsorgungsbehälter für Bewegung mit dem Alkoholtupfer auf eine andere Art und Weise. Erwärmen Sie scharfe/spitze Instrumente (nicht ab (siehe Abbildung G). ihn z.B. nicht in der Mikrowelle oder in heißem enthalten). Siehe Schritt 9 am Ende Abbildung D Injizieren Sie nicht durch Kleidung. dieser Anleitung, um zu erfahren, wie • Injizieren Sie nicht in Hautstellen, Sie Ihren Hukyndra®-Fertigpen Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn die die wund, gequetscht, gerötet, entsorgen können. Flüssigkeit gefroren war (auch wenn sie verhärtet oder vernarbt sind oder an aufgetaut ist). Schritt 2c. Waschen und trocknen Sie denen sich Dehnungsstreifen oder Ihre Hände (siehe Abbildung E). Schuppenflechte befindet. **Abbildung B** Abbildung G **Abbildung E** Überprüfen Sie das Drücken Sie die Haut zusammen und setzen Sie den Hukyndra®-Fertigpen **Arzneimittel im** Entfernen der SCHRITT auf die Injektionsstelle SCHRITT Sichtfenster SCHRITT durchsichtigen Kappe Schritt 4a. Halten Sie den Verwenden Sie den Schritt 6a. Drücken Sie die Schritt 5a. Ziehen Sie die durchsichtige Haut an der Injektionsstelle Hukyndra®-Fertigpen so, dass der Hukyndra®-Fertigpen

nicht, wenn er heruntergefallen oder Sichtfenster (siehe Abbildung H). beschädigt ist. Es ist normal, wenn Sie eine Vergewissern Sie sich, dass

Abbildung H

Kappe gerade vom Fertigpen ab (siehe Abbildung I). Es ist normal, wenn ein paar Tropfen

Flüssigkeit aus der Nadel kommen. Schritt 5b. Werfen Sie die durchsichtige Kappe weg.

Sie dürfen die durchsichtige Kappe nicht wieder aufsetzen. Das kann die Nadel beschädigen. Der Pen ist bereit für die Anwendung, wenn die

durchsichtige Kappe abgenommen wurde. **Schritt 5c.** Drehen Sie den Hukyndra®-Fertigpen so, dass die orangefarbene Nadelschutzhülse in Richtung der Injektionsstelle zeigt.

Abbildung I

zusammen, um einen erhabenen Bereich zu erzeugen, und halten Sie sie orangefarbene

Schritt 6b. Setzen Sie die Nadelschutzhülse in einem 90°-Winkel auf die Injektionsstelle (siehe Abbildung J).

Halten Sie den Pen so, dass Sie das Sichtfenster sehen können.




Abbildung J

SCHRITT Injizieren

graue Griffbereich nach oben

oder mehrere Blasen im

die Flüssigkeit klar und

Hukyndra®-Fertigpen **nicht**, wenn

die Flüssigkeit trüb oder verfärbt

ist oder Flocken oder Teilchen

zeigt. Überprüfen Sie das

Sichtfenster sehen.

farblos ist.

enthält.

Verwenden Sie den

die Injektionsstelle und halten Sie ihn gedrückt (siehe Abbildung K). • Der erste "Klick" signalisiert den Beginn der Injektion (siehe

Abbildung K). Es kann bis zu 10

Sekunden nach dem ersten "Klick"

Schritt 7a. Drücken Sie den Pen auf


dauern, bis die Injektion abgeschlossen ist. unten gegen die Injektionsstelle.

 Drücken Sie den Pen weiter nach • Die Injektion ist beendet, wenn sich

Sie möglicherweise ein zweites

"Klicken" hören (siehe Abbildung L)

die orangefarbene Anzeige im Sichtfenster nicht mehr bewegt und vergewissert haben, dass die Injektion vollständig verabreicht wurde.



Entfernen Sie den Pen nicht und lassen Sie den

Druck von der Injektionsstelle nicht los, bis Sie sich


SCHRITT abgeschlossen ist, ziehen Sie Abschluss der Injektion einen

von der Haut und Schutz Schritt 8a. Wenn die Injektion Schritt 8b. Legen Sie nach

Entfernen des Hukyndra®-Fertigpen

Wattebausch oder eine den Hukyndra®-Fertigpen langsam aus der Haut. Die Mullbinde auf die Haut der Iniektionsstelle. orangefarbene Nadelschutzhülse wird die Nadelspitze bedecken (siehe Injektionsstelle. Abbildung M). Wenn sich mehr als ein paar

Tropfen Flüssigkeit an der Iniektionsstelle befinden, bitten Sie Ihre medizinische Fachkraft um Hilfe.






Abbildung M

SCHRITT Wie soll man den benutzten Hukyndra®-Fertigpen entsorgen?

Schritt 9a. Werfen Sie Ihre benutzten Nadeln, Pens und scharfen Gegenstände sofort nach Gebrauch in einen Entsorgungsbehälter für scharfe/spitze Instrumente (siehe Abbildung N).

Entsorgen Sie den Pen nicht im Haushaltsabfall.

Schritt 9b. Die durchsichtigen Kappen, der Alkoholtupfer, der Wattebausch oder das Mullstück können in den Haushaltsabfall geworfen werden.



Wenn Sie keinen Entsorgungsbehälter für scharfe/spitze Instrumente haben, können Sie einen Haushaltsbehälter verwenden, der:

 aus einem strapazierfähigen Kunststoff besteht, • mit einem dicht schließenden, stichfesten Deckel verschlossen werden kann, ohne dass scharfe Gegenstände herauskommen können,

aufrecht und stabil während der Benutzung steht,

 auslaufsicher ist, und • ordnungsgemäß beschriftet ist, um vor gefährlichen Abfällen im Inneren des Behälters zu warnen.

Wenn Ihr Entsorgungsbehälter für scharfe/spitze Instrumente fast voll ist, müssen Sie die örtlichen Richtlinien für die richtige Entsorgung Ihres Behälters für scharfe/spitze Instrumente befolgen.

Entsorgen Sie den Behälter für scharfe/spitze Instrumente nicht über den Haushaltsabfall. Recyceln Sie den Behälter für scharfe/spitze Instrumente nicht.

STADA

Produkt/Product: HUKYND 80MG INJ PEN SD DE/AT:PIL

STADA Mat.-Nr./Mat.-No.: 9358058 DZ: 2407 STADA Art.-Nr./Art.-No.: -

Hersteller/Manufacturer: Alvotech Hf. Packer: Thermo Fisher Hersteller Art.-Nr./ Manufacturer Art.-No.: -Format/Size: 420 x 891 mm Schriftgröße/Font-size: 9 pt - 53,21 pt

Pharma-Code: -Flattermarke/Collating mark: -1. Farbe/Colour: CYAN 2. Farbe/Colour: MAGENTA 3. Farbe/Colour: ____ YI

4. Farbe/Colour: BLACK

5. Farbe/Colour: KEYLINE

6. Farbe/Colour: -7. Farbe/Colour: -8. Farbe/Colour: Version: RZ 2, Loop Datum/Date: 01,08,2024

Grafik erstellt von/Graphic made by: StS Aktueller Umlauf/Current loop: StS

Agentur/Agency: STADA Agency

Genehmigt/Approved

PZN/EAN: -