

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Echinacea STADA® Lutschtabletten

Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 Lutschtablette enthält 77 mg getrockneter Presssaft aus frischem, blühenden Purpursonnenhutkraut (83-25:1)

Sonstige Bestandteile:

Ascorbinsäure, Calciumicosanoat, Cellulosepulver, Glycerol-tristearat, Lactose-Monohydrat, Mannitol (Ph.Eur.), Natriumcycamat, Saccharin-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid methyliert, hochdisperses Siliciumdioxid, Vanillin, Zitronen-Aroma.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 20 (N1) und 50 (N2) Lutschtabletten

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten

Pharmazeutischer Unternehmer:

STADA GmbH, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 603-0; Telefax: 06101 603-259
Internet: <http://www.stada.de>

Hersteller:

STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung häufig wiederkehrender (rezidivierender) Infekte im Bereich der Atemwege und der ableitenden Harnwege.

Zur Anwendung bei Atemwegsinfekten

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Zur Anwendung bei Harnwegsinfekten

Bei Blut im Urin, bei Fieber, bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Echinacea STADA® Lutschtabletten nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegen Echinaceae purpureae herba (Purpursonnenhutkraut) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels oder gegen Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Echinacea STADA® Lutschtabletten nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen, chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galaktose-Unverträglichkeit (Galaktoseintoleranz), einem erblich bedingten Laktasemangel oder einer Glukose-Galaktose-Malabsorption leiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Zur Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher soll Echinacea STADA® Lutschtabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit wie auch bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen zwischen Echinacea STADA® Lutschtabletten und anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung



Anforderungscoupon

Echinacea STADA® Lutschtabletten

Bitte übersenden Sie mir kostenlos Ihre Informationsbroschüre über Echinacea STADA® Lutschtabletten oder zu Erkältungskrankheiten.

Tragen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse auf der Rückseite dieses Coupons ein.

STADA GmbH

Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel





Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Echinacea STADA® Lutschtabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Echinacea STADA® Lutschtabletten sonst nicht richtig wirken kann.

In welcher Dosierung und wie oft sollten Sie Echinacea STADA® Lutschtabletten anwenden?

Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahre nehmen 3 bis 4-mal täglich 1 Lutschtablette.

Die in einer Lutschtablette enthaltene Menge an getrocknetem Presssaft entspricht 2 ml Presssaft aus frischem, blühenden Purpursonnenhutkraut.

Wie und wann sollten Sie Echinacea STADA® Lutschtabletten anwenden?

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum. Die Lutschtabletten werden gelutscht oder zerkaut.

Wie lange sollten Sie Echinacea STADA® Lutschtabletten anwenden?

Sie sollten Echinacea STADA® Lutschtabletten nicht länger als 2 Wochen anwenden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu beachten, wenn Echinacea STADA® Lutschtabletten in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Für Zubereitungen aus Purpursonnenhutkraut sind bisher keine Vergiftungserscheinungen bekannt. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Echinacea STADA® Lutschtabletten angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Wenn Sie zu wenig Echinacea STADA® Lutschtabletten genommen haben oder die Einnahme von Echinacea STADA® Lutschtabletten vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie Ihnen vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformatio- n beschrieben, fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Echinacea STADA® Lutschtabletten auftreten?

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: Weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: Weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: Weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt aufsuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des

Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Wie ist Echinacea STADA® Lutschtabletten aufzubewahren?

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Stand der Information:

1. Juni 2004

9211904 0406



Echinacea STADA® Lutschtabletten enthält einen hochwertigen Pflanzenextrakt in hoher Dosierung. Der Extrakt nimmt sehr leicht Luftfeuchtigkeit auf, was auch zu einer Farbvertiefung führt. Dieser ist zwar ohne Einfluss auf die Qualität, führt jedoch zu einem braunesprenkelten Aussehen der Lutschtabletten. Die Lutschtabletten sollen daher unmittelbar vor der Anwendung aus dem Blisterstreifen (Durchdrückpackung) entnommen werden (keine Aufbewahrung in Pillendöschen usw.). Auch sollten die Lutschtabletten nicht an feuchten Orten, z.B. im Badezimmer aufbewahrt werden.



Anforderungscoupon

Echinacea STADA® Lutschtabletten

Nachname: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Bitte schneiden Sie diesen Coupon aus und senden Sie ihn an:

STADA GmbH, Abt. Marketing
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel

